

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Bonn

Direktor: Professor Dr. Freiherr von Redwitz

Erfahrungen über die
Röntgenbestrahlung bei
Prostatahypertrophie

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der Hohen Medizinischen Fakultät
der Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität
zu Bonn

Vorgelegt am 14. November 1936
von Ferdinand Orland aus Wesseling a. Rh.

Wesseling 1936
Alfred Nebel

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn

Referent: Prof. Dr. Freiherr von Redwitz.



Dem Andenken meines Vaters!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die Prostatahypertrophie ist eine Erkrankung des höheren Alters. Die Schwere des Krankheitsbildes wird dabei nicht durch die Volumenvermehrung der Vorsteherdrüse an sich, sondern durch den Grad der Harnerfschwerung und die durch diese hervorgerufenen Folgen für den gesamten Harnapparat bestimmt.

Die Prostatektomie ist die geeignete Maßnahme, die Kranken von ihrem Leiden dauernd zu befreien. Der Eingriff ist aber nicht in allen Fällen von Prostatahypertrophie indiziert. Er kann nicht mehr ausgeführt werden, wenn im Stadium der chronischen Urinretention infolge der Harnstauung schwere, irreparable Nierenschädigungen eingetreten sind. Ferner ist eine Prostataektomie nicht indiziert im Anfangsstadium bei fehlendem oder geringem Resturin und geringen Beschwerden. In diesen Fällen treten die konservativen Maßnahmen in ihr Recht. Dabei spielt eine Röntgenbestrahlung seit etwa 30 Jahren eine vielumstrittene Rolle. Die Mehrzahl der Chirurgen und Urologen verhält sich völlig ablehnend, oder erkennt die Bestrahlung nur als Vorbereitung einer späteren Operation an. Die Berichte der Röntgenologen lauten durchweg günstiger.

L a z a r u s (Deutsche Zeitschrift für Chirurgie 1917)

berichtet über 19 angeblich erfolgreich bestrahlte Fälle. Er glaubt dabei, daß nicht so sehr die Verkleinerung der prostata, als vielmehr die Beseitigung der Kongestion und des Oedems der pars prostatica für die Verringerung der Beschwerden verantwortlich zu machen sei.

H i n t z e (D.Z.f. Chirurgie 1927)

erwähnt 10 Dauerheilungen, die er in Verbindung mit Tierbluteinspritzungen erzielt haben will. Er hält dieses therapeutische Vorgehen für geeignet, die Harnerfschwerung der Prostatiker, falls sie nicht durch ascendierende Infektion kompliziert ist, dauernd zu beseitigen.

P a z z i

kommt nach Behandlung von 55 Patienten zur Ansicht, daß subjektive Besserung auch bei ausbleibender Verkleinerung der Prostata eintritt. Besonders komplizierende Blutungen kommen prompt zum stehen.

H a y e r

behauptet, 13 Fälle durch Bestrahlung geheilt zu haben.

W e h n e r

glaubt daß die unkomplizierte Prostatahypertrophie durch Bestrahlung völlig unbeeinflusst bleibt. „Weder Stillstand noch Rückgang der Wucherungen ist zu erwarten!“. Er lobt die guten Erfolge der Bestrahlung bei Reizzuständen und Blutungen.

H o l f e l d e r

bezeichnet die fibröse Form der Prostatahypertrophie als strahlenrefraktär. Von den adenomatösen bestrahlt er das I und beginnende II Stadium, ohne hierbei anzugeben, wie man klinisch die beiden Formen mit Sicherheit unterscheidet. Er weist darauf hin, daß zwar einerseits die Lebensgefahr der Operation ausgeschaltet, anderseits eine vollständige und schnelle Heilung nicht zu erwarten ist. 3—4 Wochen nach der Bestrahlung machen sich die ersten Zeichen der meist zwei Jahre anhaltenden Besserung geltend. Bei Vermehrung der Beschwerden muß erneut bestrahlt werden. Die Verkleinerung der Prostata hält er für die Besserung weniger ausschlaggebend als die günstigeren Bedingungen für eine funktionelle Anpassungsmöglichkeit.

H o l t h u f e n

bestrahlt wie Hohlfelder nur die weichen Formen im I. und II. Guyonstadium. Die günstige Wirkung in einem Drittel der Fälle führt er auf die Beseitigung der entzündlichen Kongestion, die spasmolytische Strahlenwirkung und erst zuletzt auf die Verkleinerung der Prostata zurück.

M a r k o v i t s

sieht das Wesen der Strahlenwirkung in Schädigung des proliferierenden Drüsengewebes. Bei den weichen, glandulären Hypertrophien erreicht er in einem Drittel der Fälle Besserung. Harte Formen bedeuten eine Kontraindikation der Röntgentherapie.

E c c a r d (Med. Welt 1934)

leitet die Indikation der Röntgenbestrahlung aus der Unmöglichkeit der Prostataektomie ab. In fast allen Fällen wurde gleichzeitig

die Vasektomie vorgenommen. Großer Wert ist nach seiner Ansicht auf die Behandlung der Cystitis zu legen.

O p p e n h e i m e r (Zeitschrift für Strahlentherapie 1928)

bereitet die Patienten durch Massage zur Bestrahlung vor. Die Massage soll die Konsistenz der Prostata verringern. Die besten Erfolge erzielt er bei den weichen Formen des I. Stadium. Hier erreichte er in 69% eine Monate und Jahre anhaltende Besserung. 31% blieben unbeeinflusst. Bei akuter und chronischer Verhaltung sah er keinen Einfluß, auch glaubt er durch die Röntgenbestrahlung eine Weiterentwicklung in die fortgeschrittenen Stadien trotz subjektiver Besserung nicht vermeiden zu können. Er warnt vor hohen Röntgendosen, da er nach ihnen Strikturen des Blasenhalbes gesehen hat, und da sie in der Tiefe Verwachsungen hervorrufen können, die eine spätere Operation erschweren. Auch Cystitiden und Reizzustände der Rektumschleimhaut wurden beobachtet. Den Hauptnachteil einer zu ausgiebigen Bestrahlung sieht er in einer enormen Verzögerung der Wundheilung bei späterer Operation.

T i e m a n n (Strahlentherapie 1928)

sieht gleichfalls eine wesentliche Vorbedingung für die erfolgreiche Anwendung der Röntgenstrahlen im Vorliegen adenomatöser Formen. Das I. Guyonstadium hält er für die Bestrahlung am geeignetsten, sah aber auch im II. und III. befriedigende Erfolge. In vielen Fällen läßt sich nach seiner Meinung die Weiterentwicklung in fortgeschrittenere Stadien hint anhalten.

Anfänglich wurde die Prostatahypertrophie mit hohen Einzeldosen bestrahlt. Da man aber Schädigungen in Form von Reizzuständen der Blasen- und Mastdarmschleimhaut sowie Strikturen des Blasenhalbes beobachtete, ging man zu mehrmaliger Applikation geringerer Strahlenmengen, sog. verzetzelter Dosierung über. In der Dosierung bestehen heute keine wesentlichen Unterschiede mehr.

H o l f e l d e r verabreicht eine Wirkungs-dosis von 40 bis 50% der HED und verabreicht diese Serie 3 bis 5mal im Abstand von einer Woche.

Oppenheimer bringt von einem Dammfeld aus an zwei aufeinanderfolgenden Tagen je 40% an den Herd.

Tiemann bringt im Ganzen 100% der HED innerhalb von 10 Tagen, meistens auf sechs Sitzungen verteilt, zur Wirkung. Wird dann noch nicht ein bemerkenswerter Erfolg in Gestalt spontaner Miktion erzielt, so ist der Fall als Versager anzusehen.

In der Röntgenabteilung der chirurgischen Universitätsklinik Bonn werden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ca. 55% der HED am Herd zur Geltung gebracht ($500\text{ r} = 1\text{ HED}$). Als Felder werden ein suprapubisches, ein Dammfeld und ein Sacralfeld gewählt. Diese Serien werden zwei bis fünfmal wiederholt. Zwei Serien müssen aber einen deutlichen Einfluß zeigen.

In der Röntgenabteilung der Bonner Chirurgischen Universitätsklinik wurden in den Jahren 1929—1935 71 Prostatiker bestrahlt. Die Indikation wurde gestellt, wenn eine operative Maßnahme nicht angezeigt war, oder wenn die Patienten die Operation ablehnten. In einem Falle wurde wegen eines komplizierenden Diabetes eine Fistel nicht sofort angelegt. Bei keinem Patienten war vor der Bestrahlung eine Operation gemacht, insbesondere keine Fistel angelegt worden.

Acht Patienten wurde auf Grund auswärtiger Indikation bestrahlt. Von diesen 71 Fällen scheiden für eine Beurteilung 37 aus. Bei 11 Patienten war der weitere Verlauf nicht zu verfolgen oder wegen Komplikationen ein sicheres Bild nicht zu gewinnen. 26 Patienten blieben der Bestrahlung vorzeitig fern und sind nach dem Urteil der Röntgenabteilung ungenügend bestrahlt. Als unterste Grenze ausreichender Bestrahlung wurden zwei Serien im Abstand von fünf Wochen angesehen, bei welchen je ca. 55% der HED zur Wirkung kamen.

Verwertbar bleiben insgesamt 34 Fälle.

Von 26 Patienten wurde zu Beginn der Bestrahlung ein genauer urologischer Untersuchungsbefund erhoben. 15 von diesen wurden nachuntersucht. Für eine kritische Bewertung des Erfolges kommen nur diese 15 Patienten in Frage. Die restlichen 19 Fälle, welchen nur die Angaben der Patienten über ihre Beschwerden zugrunde liegen, sollen nur zur Vervollständigung herangezogen werden.

Ich lasse die Krankengeschichten und den Verlauf der erwähnten 15 Fälle, soweit sie für die Beurteilung wichtig erscheinen, folgen.

Nr. 7159.

K. H. 62 Jahre. Oberpostschaffner.

Seit drei Jahren ist die Harnentleerung erschwert, der Patient muß stärker pressen und häufiger Wasser lassen. Er wurde wegen dieser Beschwerden elektrifiziert. Vor einer Woche trat eine akute Harnverhaltung auf.

Befund am 3. II. 1930:

Allgemeinzustand mäßig.

Prostata kaum vergrößert, ein erbsengroßer, nicht druckempfindlicher Knoten palpabel.

Resturin 0.

Konzentrationsversuch 1001—1019.

Cystoskopie: keine Cystitis.

Blauausscheidung: rechts 6', links 4'.

Stadium I. Operation nicht angezeigt.

Bestrahlung:

5., 6. XI. 30 55%

17., 18. XII. 30 55%

17., 18. II. 31 55%

Schon nach der ersten Bestrahlung bestand Beschwerdefreiheit. Der Harnstrahl wurde kräftiger, der Harndrang trat weniger oft ein. Nach zehn Wochen traten die Beschwerden in der alten Stärke wieder ein.

Nachuntersuchung: April 1935:

Miktion fast normal.

Prostata sehr klein, ziemlich derb.

Resturin 0.

Allgemeinzustand gut.

Erfolg nach vierjähriger Beobachtungszeit.

Objektiv Verkleinerung der Prostata.

Subjektiv normale Miktion, nur vorübergehende Besserung der Beschwerden.

Nr. 186.

P. S. 51 Jahre. Steinbrecher.

Seit einem Vierteljahr ist die Harnentleerung erschwert, der Harn-
drang ist vermehrt.

Befund am 9. II. 30:

Allgemeinzustand reduziert.

Cor. o. B. Bronchitis.

rechts Hodenexstirpation.

Prostata wenig vergrößert.

Resturin o.

Urin Alb. (+). Leuko. +.

Konzentrationsversuch 1001—1015.

Cystoskopie: Cystitis, Übergangsfalte glatt, mäßige Balkenblase.

Blauauscheidung beiderseits 5'.

Stadium I.

Bestrahlung:

29. 30. I. 30	55%
9. 10. IV.	45%
3. 4. VI.	45%
6. 8. IX.	55%

Sofort nach der Bestrahlung empfand der Patient Erleichterung,
die aber nur wenige Tage anhielt. In der Folgezeit war die Miktion
nur tropfenweise möglich, es bestand vermehrter Harndrang.
Katheterismus war fast täglich notwendig. In der Nierengegend
traten Schmerzen auf.

Nachuntersuchung: April 1935.

Linke Niere druckempfindlich.

Prostata nicht vergrößert, mäßig derb.

Resturin nicht feststellbar, da der Patient sich vorher kathetri-
fierte.

Urin: klar. Alb. +; Leuk. +; Ery. +; Bakt. +.

Cystoskopie: mäßige Blakenblase.

Erfolg nach fünfjähriger Beobachtungszeit:

Objektiv gleichbleibender Prostatabefund, spontane Miktion
nicht möglich, Übergang in Stadium III.

Subjektiv verstärkte Beschwerden nach kurzer Besserung.

Nr.

J. B. 69 Jahre.

Seit drei Monaten muß der Patient beim Wasserlassen stark pressen, der Urin wurde trüb, bei der Defäkation traten Schmerzen auf.

Befund am 11. 2. 33:

Allgemeinzustand leidlich.

Doppelseitige Leistenhernie.

Prostata kleinapfelgroß.

Kein Resturin.

I. Stadium.

Bestrahlung:

12. 13. I. 33 55%

15. 16. II 60%

Einige Wochen bemerkte der Patient eine Besserung der Harnbeschwerden. Der Strahl wurde kräftiger, der Harndrang trat seltener ein. Beschwerden bei der Defäkation verschwanden, stellten sich aber jetzt vor der Miktion ein, es trat ein brennendes Gefühl in der Harnröhre auf. Der Patient klagt jetzt auch über Inkontinenz. Der Allgemeinzustand besserte sich, es trat eine Gewichtszunahme von 20 Pfund ein.

Nachuntersuchung: April 1935.

Allgemeinzustand gut.

Prostata pflaumengroß, mäßig derb, glatt. Schleimhaut verschiebblich.

Resturin 15 ccm.

Erfolg nach zweijähriger Beobachtung:

Objektiver Organbefund im wesentlichen gleich. Vielleicht geringe Erschwerung der Harnentleerung.

Subjektiv geringe Besserung der Beschwerden.

Nr. 1348.

M. Br. 75 Jahre. Invalide.

Seit etwa fünf Jahren bestehen Miktionsbeschwerden, insbesondere Schmerzen. In der letzten Zeit terminale Hämaturie.

Am 7. 5. 32 Punktion einer Spermatocoele.

Am 11. 5. 32 Semicastratio wegen chronischer eitriger Epididymitis.

Am 15. 5. 32 umfangreiche Blutungen aus der Harnröhre.

Befund am 10. 5. 32:

Allgemeinzustand gut.

Herz, Lunge, Abdomen o. B.

Prostata kleinapfelgroß, weich. Seitenlappenhypertrophie.

Urin: Leukoc. +; Erytroc. + (Blutung).

Resturin o.

Cystoskopie: Blutungen im Bereich der Prostata, Einzelheiten wegen der Blutung trotz ausgiebiger Spülung nicht erkennbar.

Stadium I.

Bestrahlung:

17. 18. V. 32 55%

23. 30. VI. 55%

5. 9. 32 55%

Die Blutungen kamen nach der ersten Bestrahlung zum stehen.

Nachuntersuchung: April 1935.

Miktion nicht erschwert.

Prostata gut apfelgroß, glatt, weich. Schleimhaut verschieblich.

Resturin o. B.

Urin: klar. Alb. +; Leuko. +.

Erfolg nach dreijähriger Beobachtung.

Objektiver Befund unverändert, Aufhören der Blutungen.

Subjektiv: Patient ist beschwerdefrei geworden.

Nr. 4958.

P. O. Ackerer. 64 Jahre.

Seit einem halben Jahr häufiger Harndrang. Nachts muß der Patient bis zu 30mal aufstehen. Mehrmals akute Harnverhaltung.

Befund am 22. 7. 30:

Allgemeinzustand gut.

Emphysem, Herztöne gedoppelt.

Blutdruck R.R. 125/80.

Rechts direkte Leisterhernie.

Prostata groß, weich.

Kein Resturin.

Urin: Alb. (+); Erytroz. +; Leukoz. ++.

Konzentrationsversuch 1001—1014.

Cystoskopie: mäßige Balkenblase, Kolicystitis.

Stadium I.

Bestrahlung:

29. 30. VII. 30 55%

9. 11. IX. 55%

6. XI. 30%

9. 10. II. 31 55%

Sofort nach der Bestrahlung trat Besserung der Beschwerden ein.

Nach einem Autounfall 1934, also drei Jahre nach der Bestrahlung,

trat akute Harnverhaltung auf, die sich noch einmal wiederholte. Der Patient klagt besonders über häufigen Harndrang.

Nachuntersuchung 15. I. 34:

Cystoskopisch Ca.-Verdacht.

Nachuntersuchung April 1935:

Allgemeinzustand leidlich.

Leistenhernie rechts.

Prostata apfelsinengroß, oberer Rand nicht umgreifbar, derb.

Links harter gut abgegrenzter Knoten.

Resturin: 190 ccm.

Urin: Alb. $\mp$; Leuko. $\mathbf{++}$; Spez. G. 1001.

Erfolg:

Objektiv Vergrößerung des Prostatavolumens, Erschwerung der Harnentleerung.

Subjektiv: nach drei Jahre anhaltender Besserung starke Beschwerden.

Nach vorübergehender Besserung subjektiv und objektiv wieder Verschlimmerung.

Im ersten Stadium kamen fünf Patienten zur Bestrahlung. Eine Verkleinerung der Prostata wurde in einem Falle festgestellt. Hier besserte sich auch das Allgemeinbefinden, die Miktion geht zwar unter Schmerzen, sonst aber ohne Behinderung vor sich.

In einem anderen Falle schwanden die subjektiven Beschwerden vollkommen. Da aber objektiv eine weitere Vergrößerung der Prostata festgestellt wurde, ist anzunehmen, daß nicht die zellschädigende Wirkung der Strahlen für die Besserung verantwortlich zu machen ist, sondern die entzündungshemmende.

In den drei anderen Fällen muß aber das Ergebnis der Bestrahlung als völlig unzureichend bezeichnet werden. Alle Fälle gingen in das II. bzw. III. Stadium mit Resturin über. In einem Falle traten akute Harnverhaltungen die schon vor der Bestrahlung vorkamen, weiterhin auf.

Über den oft behaupteten günstigen Einfluß der Bestrahlung auf Blutungen kann kein Urteil abgegeben werden, da eine solche nur bei einem Patienten bestand. Blutungen treten bei der Prostatahypertrophie nicht selten auf, und stehen im allgemeinen

spontan oder auf einfache Blasenbehandlung hin. Eine Cystitis verschwand einmal im Verlauf der Behandlung, in einem anderen Falle besteht sie fort.

Nr. 4056.

K. S. 66 Jahre. Oberpostinspektor a. D.

Seit einem halben Jahr Harnbeschwerden bis zur akuten Verhaltung. Zeitweise Dauerkatheter. Vor fünf Wochen wurden die Beschwerden heftiger, besonders der Harndrang häufiger.

Befund am 4. 12. 1929:

Allgemeinzustand gut.

Organe o. B.

Prostata groß, weich.

Resturin 40 ccm.

Wasserversuch 1004—1012.

Urin: Alb. +; Leukoz. +++; Erytroz. +.

Cystoskopie: Cystitis, Balkenblase, Mittellappenhypertrophie.

II. Stadium. Operation wegen geringen Resturins nicht angezeigt.

Bestrahlung:

12. 13. XII. 29 60%

29. 29. I. 30 55%

22. 24. VII. 30 40%

Drei Monate nach der ersten Bestrahlung trat Besserung der Miktionsbeschwerden ein. Die Miktion blieb aber eindeutig erschwert.

Nach einiger Zeit machte sich Nykturie bemerkbar.

Nachuntersuchung: 14. I. 31.

Miktion ohne Störung.

Prostata mittelderb, 2 Höcker palpabel.

Resturin 50 ccm.

Urin: Alb. +; Leukoz. +++.

Konzentrationsversuch 1002—1012.

Erfolg nach einjähriger Beobachtung:

Objektiver Befund im wesentlichen gleichbleibend.

Subjektiv weitgehende Besserung.

Nr. 5187.

W. H. 71 Jahre. Landwirt.

Seit einem Jahr beim Wasserlassen Beschwerden. Dünner Strahl. Nachtröpfeln. Zeitweise Dauerkatheter.

Befund am 2. 8. 30:

Allgemeinstatus gut.

2. Aortenton klappend. Blutdruck R.R. 130/85.

Alterskyphose, Altersemphysem.

Leichte Steigerung der Patellarreflexe.

Beiderseits Hodenbruch.

Prostata hühnereigroß, mittelderb.

Konzentrationsversuch 1006—1015.

Resturin 100 ccm.

Schwere Cystitis.

Stadium II. Anlage einer Fistel abgelehnt.

Bestrahlung:

6. 7. VIII. 30 40%

11. 12. IX. 55%

Nach der Bestrahlung sofort Besserung der Beschwerden. Nach drei Jahren traten erneut Beschwerden auf. Einmal akute Harnverhaltung, Nykturie.

Nachuntersuchung: im April 1935.

Allgemeinstatus senil.

Prostata kleinapfelgroß, mäßig derb.

Schleimhaut verschieblich.

Resturin 20 ccm.

Urin: Alb. (+); Leukoz. ++.

Erfolg nach fünf Jahren:

Objektiv Fortschreiten des Drüsenwachstums. Harnentleerung vielleicht etwas besser.

Subjektiv nach drei Jahren anhaltender Besserung erneut Verschlimmerung.

Nr. 46 b.

K. I. 62 Jahre.

Seit zwei Jahren Miktionsbeschwerden, Inkontinenz, Schmerzen. Einmal akute Harnverhaltung.

Befund am 1. 9. 32.

Sehr guter Allgemeinzustand.

Prostata vergrößert, glatt.

Resturin 20 ccm.

Cystoskopie: Cystitis.

Blauauscheidung beiderseits 4'.

Stadium II. Operation nicht angezeigt.

Bestrahlung:

6. 7. IX. 32	55%
6. 7. X.	55%
6. 7. XI.	55%

Sofort nach der Bestrahlung empfand der Patient Erleichterung. Im Herbst eines jeden Jahres trat Verschlimmerung ein. Zweimal akute Harnverhaltung.

Nachuntersuchung: April 1935.

Allgemeinzustand sehr gut.

Prostata gut apfelgroß, mäßig derb.

Schleimhaut gut verschieblich.

Resturin 5 ccm.

Urin: Leukoz. +.

Erfolg nach zweieinhalbjähriger Beobachtung.

Objektiv keine wesentliche Änderung.

Subjektiv vorübergehende Besserung.

Nr. 2717.

J. K. 61 Jahre. Weichensteller.

Seit drei Jahren bemerkte der Patient eine Schwächung des Harnstrahls, er muß stärker pressen. Der Harndrang ist vermehrt.

Befund am 7. 7. 31.

Allgemeinstatus gut.

2. Pulmonalton verstärkt.

Prostata kleinapfelgroß, weich, glatt.

Resturin 20 ccm. Wasserversuch 1004—1014.

Urin: Alb. (+). Leukoz ++ Erytroz. +.

Cystoskopie: keine Cystitis.

Seitenlappen stark ins Blasenlumen vorspringend.

Stadium II: Operation wegen schlechter Konzentration nicht möglich.

Bestrahlung:

10. 11. VII. 31	55%
19. 20. VIII.	55%
20. 21. X.	55%

Beim Verlassen der Klinik war der Patient beschwerdefrei.

Nachuntersuchung am 13. IV. 32.

Geringe Miktionsbeschwerden.

Allgemeinzustand gleichbleibend.

Prostatabefund unverändert.

Resturin 350 ccm.

Urin Alb (+).

Wasserversuch 1015—1020.

Cystoskopie: Cystitis.

Operation wegen schlechter Ausscheidungsverhältnisse nicht ausführbar.

Im Juni 1933 gab der Patient an, beschwerdefrei zu sein.

23. Juni 1934 Tod an Pankreaskarzinom.

Erfolg. Objektiver Befund 1 Jahr nach Bestrahlung unverändert.

Subjektiv 2 Jahre anhaltende erhebliche Besserung.

Nr. 1794.

H. B., 67 Jahre.

Vor 2 Jahren hatte der Patient nach Alkoholgenuß eine akute Harnverhaltung, die durch Katheterismus beseitigt wurde. Er hielt in der Folgezeit eine von seinem Hausarzt verordnete Diät. Bei Erkältungen oder nach Alkoholgenuß trat regelmäßig akute Harnverhaltung auf, die jedesmal Katheterismus erforderte.

Befund am 27. 8. 29:

Kräftiger Patient.

Zunge trocken, belegt.

Thorax starr, Grenzen tiefliegend. 2. Aortenton verstärkt.

Prostata groß, ziemlich derb.

Resturin 25 ccm.

Urin: Alb. +; Leukoz. +; Bakterien, Epithelien.

Wasserversuch 1002—1018.

Cystoskopie Mittellappenhypertrophie, Balkenblase, Pseudodivertikel.

II. Stadium. Operation verweigert.

Bestrahlung:

8. 10. VII. 29	40%
16. 18. IV.	40%
23. 25. X.	40%
19. 21. I. 30	45%

Einige Wochen nach der Bestrahlung trat Besserung ein. Der Urin blieb trübe. Bei Diätfehlern und Erkältungen traten regelmäßig Harnverhaltungen auf.

Nachuntersuchung April 1935:

Seniler Allgemeinzustand.

Arteriosklerose.

Zunge feucht.

Prostata kleinapfelgroß, beide Lappen gleich vergrößert.

Mäßig derb.

Schleimhaut verschiebbar.

Resturin 30 ccm.

Urin trübe, Fibrinflocken.

Alb. +. Leukoz. ++++. Bakterien.

Erfolg nach 5jähriger Beobachtungszeit.

Objektiv keine Veränderung.

Subjektiv keine wesentliche Besserung.

Nr. 5585.

H. M., 72 Jahre.

Seit 6 Jahren häufiger, plötzlicher Harndrang, beim Wasserlassen muß der Patient stärker pressen. Cystitische Beschwerden.

Befund am 11. 11. 31:

Guter Allgemeinzustand.

Erster Spitzenton unrein.

Blutdruck R.R. 160/80.

Prostata kleinapfelgroß, mäßig derb, glatt.

Resturin 160 ccm.

Urin Alb. +. Sach. 1,4%.

II. Stadium. Operation wegen Diabetes nicht ausgeführt.

Bestrahlung:

26. 27. XI. 31 55%

4. 5. I. 32 55%

4. 5. III. 55%

3. 4. VI 55%

13. 14. XII. 55%

19. 20. VII. 33 55%

Nach Monaten trat eine Besserung des Allgemeinbefindens ein, die Harnbeschwerden blieben jedoch fast unbeeinflusst. Die cystitischen Beschwerden besserten sich auf Harndesinficienta. Nach Alkoholgenuß traten regelmäßig starke Schmerzen auf. Akute Harnverhaltungen konnten nicht verhindert werden. Im März 1935 starb der Patient vor Anlage einer Blasenfistel unter urämischen Erscheinungen an einer Bronchopneumonie.

Aufnahmebefund März 1935.

Schlechter Allgemeinzustand.

Blutdruck R.R. 125/70.

Prostata apfelgroß, rechts stärker vergrößert, derb, glatt.

Resturin 180 ccm.

Urin fast eitrig.

Alb. +. Sach. —. Leukoz. ++++. Erytroz. +. Bakt. +.

Konzentrationsversuch 1008—1016.

Trotz Anlage eines Dauerkatheters verschlechterte sich der Zustand des Patienten. Exitus.

Auszug aus dem Sektionsbefund:

Knollige Hypertrophie der Prostata mit walnußgroßen Seiten und Mittellappen. Dilatierte Balkenblase, mehrere Divertikel. Starke Injektion beider Nierenbecken. Trübe große Niere mit Schrumpferden.

Erfolg nach 3jähriger Beobachtungszeit.

Objektiv keine Besserung.

Subjektiv konnten die Beschwerden nicht verringert werden.

Nr. 3687.

J. D., 55 Jahre.

Seit 5 Jahren hatte der Patient Miktionsbeschwerden, die sich in Brennen in der Harnröhre und in erschwerter Entleerung zeigten. Nach Alkoholgenuß waren die Beschwerden jedesmal ausgeprägter.

Befund im Juli 1932.

Allgemeinzustand ausreichend.

Organe o. B.

Prostata kleinapfelgroß, linker Lappen deutlicher vergrößert. Ca Verdacht.

Resturin 15—20 ccm.

Urin: Alb. (+), Leukoz. +. Erytroz. +.

Konzentrationsversuch 1002—1012.

Cystoskopie keine Cystitis. Blauausfärbung beiderseits 4'.

II. Stadium, Operation nicht angezeigt.

Bestrahlung:

13. 15. VII. 32 55%

19. 20. IX. 55%

23. 24. XI. 55%

23. 24. II. 33 55%

Einige Monate nach der Bestrahlung trat eine geringe Besserung auf, im ganzen empfand der Patient jedoch kaum Erleichterung.

Nachuntersuchung April 1935.

Der Patient muß tagsüber alle 2 Stunden urinieren.

Prostata pflaumengroß, rechts oben hart, scharf begrenzt.

Urin klar Alb. (+). Leukoz. +.

Resturin 30 ccm.

Erfolg nach 3jähriger Beobachtungszeit:

Verkleinerung des Prostatavolumens, sonst keine wesentliche Änderung.

Subjektiv kaum Besserung.

Nr. 4101.

J. B., 65 Jahre.

Vor 10 Jahren Go.

Seit $\frac{1}{2}$ Jahr häufiger Harndrang. Der Patient muß stärker pressen, am Ende der Miktion verspürt er ein Brennen in der Harnröhre.

Seit 4 Tagen heftigere Beschwerden.

Befund am 23. VI. 30:

Allgemeinzustand kräftig.

Verstärkter 2. Pulmonalton.

Blutdruck R.R. 125/65.

Prostata mittelgroß, weich, glatt.

Schleimhaut verschieblich.

Resturin 150 ccm.

Urin: Alb. +, Leukoz. +, Streptokokkus mucosus.

Cystoskopie diffuse Cystitis.

Leichte Balkenblase.

Blauauscheidung, beiderseits 4'.

II. Stadium. Operation abgelehnt.

Bestrahlung:

7. 9. VII. 30 55 %

7. 8. VIII. 45 %

16. 18. XI. 45 %

3 Monate nach der Bestrahlung war der Patient beschwerdefrei.

Nach 3 Jahren erneute Beschwerden.

Nachuntersuchung Dezember 1934.

Seit 14 Tagen starker Drang, Polyurie.

Allgemeinzustand mäßig.

Prostata apfelgroß, glatt, derb.

Resturin 160—200 ccm.

Cystoskopie wegen Tenesmen abgebrochen.

Zweizeitige suprapubische Prostatektomie.

Fistel am 2. I. 35.

Prostatektomie 9. IV. 35.

Bei der Operation war der rechte Lappen fest mit der Umgebung verwachsen, so daß die Entfernung außerordentlich schwierig war. Es ist nicht zu entscheiden, ob die Verwachsung mit der Bestrahlung in ursächlichem Zusammenhang steht. Zu bedenken ist, daß der Patient eine Go durchgemacht hatte.

Objektiver Befund unverändert.

Subjektiv nach 3jähriger Beschwerdefreiheit erneut heftige Beschwerden, die die Prostatektomie nötig machten.

Nr. 5999.

J. L., 65 Jahre.

Potator, Bruder an Blasenleiden gestorben.

Seit 4 Jahren muß der Patient beim Wasserlassen pressen und lange warten bis der Urin kommt. Häufig tritt ganz plötzlicher Drang auf. Nach Alkoholgenuß oft akute Harnverhaltung.

Befund im August 1930:

Guter Allgemeinzustand.

Beniger Tumor am os pubis.

Linker testis atrophisch.

Prostata gut apfelgroß.

750 ccm. Urin durch Katheter abgelassen.

Urin Alb. (+), Leukoz. +, Erytroz. +.

Konzentrationsversuch 1008—1023.

Cystoskopie: Verwölbung an der Übergangsfalte.

Trabekelzeichnung.

Blauauscheidung beiderseits 4'.

Stadium II. Operation abgelehnt.

B. Bestrahlung:

19. 21. VIII. 30 60%

22. 23. IX. 45%

18. 20. XI. 55%

26. I. 31 30%

Der Patient empfand nach der Bestrahlung keine Erleichterung. Nach 10 Monaten entschloß er sich zur Operation, da mittlerweile 17 mal akute Harnverhaltung aufgetreten war.

4. 11. 31 suprapubische Prostatektomie.

Die Prostata ragt weit ins Blasenlumen vor.

Die Ablösung gelang leicht unter geringer Blutung, der Heilungsverlauf war ungestört.

Prostatabefund

makroskopisch: hühnereigroß, prallelastisch, keine Anzeichen maligner Entartung,

histologisch: Knotige, adenomatöse Hypertrophie, ein Knoten ödematös geschwollen. Schleimhaut gerötet.

Erfolg nach einjähriger Beobachtung.

Die Bestrahlung hat objektiv und subjektiv keine Änderung des Zustandes herbeigeführt.

Für Röntgenstrahlen spezifische Veränderungen wurden an der entfernten Drüse nicht gefunden.

Nr. 2626.

K. Sch., 60 Jahre.

Seit 3 Jahren Beschwerden bestehend in Schwächung des Harnstrahls, der Patient muß stark pressen. Vor 3 Tagen akute Harnverhaltung.

Befund am 9. VII. 30:

Zunge belegt, Emphysem.

Phimose.

Prostata: gut kastaniengroße Seitenlappen.

Resturin 100 ccm.

Wasserverfuch 1001—1014.

II. Stadium. Operation abgelehnt.

Bestrahlung:

22. 24. VII. 30 55%

26. 28. VIII. 55%

16. 17. X. 55%

14. 16. I. 31 55%

Der Patient empfand keine Besserung der Miktionsbeschwerden.

Nach $\frac{3}{4}$ Jahr waren die Beschwerden so stark, besonders akute Harnverhaltungen traten so häufig ein, daß der Patient sich zur Operation entschloß.

Befund am 20. 4. 31:

Resturin 550 ccm.

Großer in die Blase vorspringender Adenomknoten.

Nach der Prostatektomie wurde der Patient beschwerdefrei.

Erfolg nach $\frac{3}{4}$ jähriger Beobachtung:

Objektiv und subjektiv kein Einfluß.

Zehn Patienten kamen im zweiten Stadium zur Behandlung. In nur einem Falle trat eine Verkleinerung der Prostata ein, in fünf Fällen blieb der Prostatabefund unverändert, viermal wurde die Prostata größer als vor der Bestrahlung gefunden.

Es ist bekannt, daß ohne jede Behandlung das Wachstum der Prostata zum Stillstand kommen kann. Es ist aber bei der Häufigkeit in vorliegendem Material anzunehmen, daß der Stillstand des Drüsenwachstums in der Mehrzahl der Fälle eine Folge der Bestrahlung ist. Der histologische Befund eines Operationspräparates lautet:

„Knotige, adenomatöse Hypertrophie, ein Knoten ödematös geschwollen, Schleimhaut gerötet.“

In dem Sektionsprotokoll eines Falles heißt es:

„Knotige Hypertrophie der Protafta mit walnußgroßen Seiten- und Mittellappen. Dilatierte Balkenblase, mehrere Divertikel. Starke Injektion beider Nierenbecken. Trübe, große Niere mit Schrumpferden.“

In beiden Fällen sind an der Protafta keine Veränderungen gefunden worden, die auf Strahlenwirkung zurückzuführen waren.

In einem Falle betrug der Resturin vor der Bestrahlung 100 ccm, bei der Nachuntersuchung war er auf 20 ccm herabgegangen. In diesem Falle läßt sich somit eine Besserung der Harnentleerung annehmen. In allen anderen Fällen trat keine wesentliche Besserung der Entleerungsverhältnisse ein. Nur einmal blieben vor der Bestrahlung vorhandene Harnverhaltungen aus, während sechs Patienten wegen akuter Harnverhaltung katherisiert werden mußten. In einem Falle traten nach der Behandlung vorher nicht vorhandene Harnverhaltungen auf.

Bei vier Patienten hat die Bestrahlung einen günstigen Einfluß auf die subjektiven Beschwerden ausgeübt. Ein Patient gab ein Jahr nach der Bestrahlung an, beschwerdefrei zu sein. Da er zwei Jahre nach der Bestrahlung an Pankreaskarzinom starb, ist nicht zu entscheiden, ob die subjektive Besserung von Dauer war. Bei den anderen Patienten traten die Beschwerden nach 3 bis 4 Jahre anhaltender Besserung erneut auf. Ein dauernder Einfluß ist also in keinem Falle festzustellen.

In einer kurzen Übersicht seien auch die Fälle erwähnt, in welchen die Erhebung eines objektiven Befundes nach der Bestrahlung nicht möglich war. Über den Verlauf und die Beeinflussung der subjektiven Beschwerden berichteten die Patienten auf Fragebögen, die ihnen 1931, 1933 und 1935 zugesandt wurden.

Subjektiv beschwerdefrei.

Alter	Beschwerden	Befund	Stadium	Dosierung	Eintritt der Besserung	Erfolg	Beobach- tungszeit
A. G. 60 Jahre Nr. 3291	Seit einigen Jahren Miktion tropfen- weise, schmerzhaft. Pollakurie 20—30 mal, trüber Urin	Prostata gänseigroß Resturin 30 cem Konzentrations- versuch 1004— 1012 Cystitis	II.	31. VIII. 31. 1. VIII. 31. 550/0 8,9. IX. 31. 550/0 3,4. XI. 31. 550/0	Nach Monaten	Noch 1 mal akute Harnverhaltung Beschwerdefrei Keine sonstige Behandlung	4 Jahre
S. S. 56 Jahre amb.	Seit einem haben Jahr beim Wasser- lassen Brennen in der Harnröhre	Prostata vergrößert, Mäßig derb	I.	7,8. III. 33. 550/0 12,13. IV. 550/0 8. VI. 33. 300/0	Nach Wochen	Noch 1 mal akute Harnverhaltung Beschwerdefrei Keine sonstige Behandlung	2 Jahre
J. K. 47 Jahre Nr. 2702	Seit 1/2 Jahr vermehrter Drang, dünner Harnstrahl Pressen	Mittellappen- hypertrophie. Prostata mäßig derb, kein Resturin Konzentrations- versuch 1002-1017 Keine Cystitis	I.	29,30. IV. 30 450/0 23,24. VI. 450/0	Sofort	Urin wurde klar, der Harnstrahl kräftiger. Patient muß noch stärker pressen	5 Jahre

Erhebliche subjektive Besserung.

W. S. 58 Jahre Nr. 4277	Seit 6 Wochen beim urinieren Brennen in der Harnröhre Häufiger Drang	Prostata mittelgroß, derb Kein Resturin Urin: Sed. Leukoz +++ Konzentrations- versuch 1002-1012 Cystoskopie: Diffuse Cystitis ge- ringe Balkenblase Blauausscheidung beiderseits 3°	I.	29,30. I. 30 550/0 27,28. II. 450/0 8,9. IV. 450/0 5,6. VI. 450/0	Nach Tagen	Kräftigung des Harnstrahls. Urin meist klar, bis- weilen blutig Patient braucht weniger stark pressen	5 Jahre
-------------------------------	--	--	----	--	------------	---	---------

Subjektive Besserung, aber noch erhebliche Beschwerden.

Alter	Beschwerden	Befund	Stadium	Dosierung	Eintritt der Besserung	Erfolg	Beobachtungszeit
H. St. 60 Jahre	Seit 1 $\frac{1}{2}$ Jahr erschwerte Miktion. Vor 1. Woche akute Harnverhaltung	Prostata groß, weich kein Resturin. Urin: Alb. + Leukoz. + Bakt. + Wasserversuch 1001-1015. Cystitis Balkenblase	I.	8, 10. VIII. 29 45 $\frac{0}{10}$ 16, 10. 29 15 $\frac{0}{10}$ 8, 9. VIII. 30 45 $\frac{0}{10}$ 29. VI. 30 35 $\frac{0}{10}$	nach Wochen	Besserung der cystitischen Beschwerden. Patient muß noch stark pressen. Mehrere akute Harnverhaltungen	5 Jahre
Nr. 1922							
B. L. 64 Jahre	Seit 1 $\frac{1}{2}$ Jahr dünner Harnstrahl Schmerzen, häufiger Drang Patient muß stärker pressen	Prostata mittelgroß, derb Resturin 100 ccm Cystoskopie: Mittellappen vorspringend. Cystitis Balkenblase Wasserversuch 1002-1012	II.	11*16. I. 29. 40 $\frac{0}{10}$ 2, 8. III. 25 $\frac{0}{10}$ 20, 26. IV. 30 $\frac{0}{10}$	sofort	Geringe Besserung der Beschwerden noch häufiger Drang. Schmerzen bei der Miktion	6 Jahre
Nr. 12637							
H. N. 70 Jahre	Seit mehreren Jahren prostatistische Beschwerden Akute Harnverhaltungen	Prostata kleinapfelgroß, weich kein Resturin Urin: Leukoz + Konzentrationsversuch 1001-1023	I.	19, 20. VI. 31 55 $\frac{0}{10}$ 23, 24. VIII. 55 $\frac{0}{10}$ 24, 25. IX. 55 $\frac{0}{10}$	nach Wochen	Miktion geht leichter von statten. Noch 2 mal akute Harnverhaltung. Pollakisurie	4 Jahre
Nr. 1997							
St. W. 61 Jahre	Schwacher Strahl Patient muß stark pressen. Cystitische Beschwerden			31. VIII. 31 1. IX. 31 7, 8. X. 31 55 $\frac{0}{10}$	nach 14 Tagen	Kräftigung des Harnstrahls, sonst unverändert.	3 $\frac{1}{2}$ Jahre
amb.							

Vorübergehende Besserung

Alter	Beschwerden	Befund	Stadium	Dosierung	Eintritt der Besserung	Erfolg	subjekt. Verschlimmerung	Beobachtungszeit	Sonstige Behandlung
A. G. 74 Jahre Nr. 7654	Schwächung d. Harnstrahls, Patient muß stark pressen. Trüber Urin			2,3 XII. 30 550 ⁰ / ₀ 12,13. I. 31 550 ⁰ / ₀ 11,12. III. 550 ⁰ / ₀	Nach einigen Monaten	Cystitis gebessert Miktionsbeschwerden gleichbleibend	nach 4 Jahren akute Harnverhaltungen	4 1/2 Jahre	Katheter
K. J. amb.	Miktion erschwert akute Harnverhaltung			7,8. IX. 32 550 ⁰ / ₀ 20,21. XI. 550 ⁰ / ₀	Sofort	Miktionsbeschwerden gebessert	Wieder akute Harnverhaltungen	2 1/2 Jahre	Katheter
R. J. 70 Jahre amb.	Seit 2 Jahren prostatiche Beschwerden Pollakisurie akute Harnverhaltung			28,29. IV. 33 550 ⁰ / ₀ 26,27 V. 33 550 ⁰ / ₀	Nach einigen Monaten	Miktion seltener und erleichtert	Nach 8 Monaten wieder akute Harnverhaltungen	1 3/4 Jahr	Katheter
E. M. amb.	Miktionsbeschwerden akute Harnverhaltung			7,9. V. 32 550 ⁰ / ₀ 16,17. VI. 550 ⁰ / ₀ 12,13. IX. 550 ⁰ / ₀		Besserung der subjektiven Beschwerden	Uebergang in III	1 Jahr	Katheter Exitus unter ürämischen Erscheinungen
P. T. 81 Jahre 7309	Regelmäßiger Katheterismus		III.	10,11. XII. 30 550 ⁰ / ₀ 21,22. I. 31 550 ⁰ / ₀	Sofort	Kräftigung des Harnstrahls Besserung der Cystitis	Ischuria paradoxa blutiger Urin Urämische Erscheinungen	4 1/2 Jahre	
F. W. Nr. 7969	Seit einem Jahr Beschwerden, abgesehwächter Strahl Pollakisurie	Allgemeinzustand gut, hydrocele Funic. Spermatic. Prostata klein, apfelgroßweich, Resturin 70 ccm. Cystoskopie: Keine Cystitis mäßige Balkenblase	II.	11,12. XII. 30 550 ⁰ / ₀ 21,23. I. 31 550 ⁰ / ₀ 1,2. IV. 31 550 ⁰ / ₀ 2,3 XI. 31 550 ⁰ / ₀	Nach Wochen	Gewichtszunahme, Besserung des Allgemeinzustandes.	Nach 3/4 Jahr Steigerung des Resturins auf 160 ccm. Stärkere subjektive Beschwerden	1 Jahr	Prostatalektomie

Kein Einfluß auf die subjektiven Beschwerden.

Alter	Beschwerden	Befund	Stadium	Dosierung	Verlauf	Beobach- tungszeit	Sonstige Behandlung
G. H. 71 Jahre Nr. 4886	Seit 2 Jahren protestatische Be- schwerden leichter Art. Miktio kaum erschwert. Vor 12 Tagen akute Harn- verhaltungen	Prostata gut apfel- groß, derb Resturin: 210 ccm. Prostatektomie abgelehnt	II.	10,12. VII. 30 55% 4,5. XI. 30 55%	Keine Verminderung der Beschwerden. Nach 2 Jahren in III. Stadium übergegangen	4 1/2 Jahre	Katheterismus
B. H. 59 Jahre Nr. 3735	Seit 3 Jahren prostatistische Be- schwerden, vor 3 Tagen Schmerzen	Linker Lappen gering vergrößert Kein Resturin Cystitis Balkenblase	I.	8,9. VIII. 32 55% 16. IX. 32 40%	Keine Besserung Miktio erschwert trüber Urin Schmerzen in der Harnröhre und Nierengegend	2 1/2 Jahre	
N. K. 69 Jahre Nr. 4649	Seit 17 Jahren Harnbeschwerden, die vor 3 Jahren heftiger wurden. In der letzten Zeit regelmäßiger Selbstkatheteris- mus	Prostata faustgroß, weich, glatt. Seitenlappen- hypertrophie Resturin 180 ccm.	III.	12,13. X. 31. 55% 25,26. XI. 55% 1,2. III. 32. 55% 9,10. VI. 32. 55%	Unbeeinflußt zeit- weise heftigste Beschwerden Häufiger Kathete- rismus Starker Durst Schmerzen in Nierengegend und Hoden	4 Jahre	Katheterismus
O. S. 50 Jahre amb.	Seit 1 Jahr Harn- beschwerden Vor 3 Tagen akute Harnverhaltung	Prostata gänseeigroß, glatt		10,11. V. 32. 55% 9,11. VI. 32. 55%	Kein Einfluß, häufige akute Harnverhaltung	1/2 Jahr	Blasenfistel Prostatektomie
R. T. 71 Jahre amb.	Seit 10 Jahren Miktions- beschwerden			12,15. IV. 33 55% 11,3. VI. 33. 55% 5,7. II. 34. 55%	Allgemeinzustand etwas gebessert, sonst gleich- bleibend	2 Jahre	Harn- desinfizientia

Ein Einfluß auf die subjektiven Beschwerden der 19 Patienten trat in 14 Fällen ein.

Vollständig beschwerdefrei fühlen sich nach zwei und vier Jahren zwei Patienten. Zwei andere Patienten, die im ersten Stadium mit verhältnismäßig geringen Beschwerden zur Bestrahlung kamen, geben eine erhebliche Verminderung der Beschwerden an, die in den beiden Fällen schon fünf Jahre anhält.

Geringe dauernde Besserung verspüren vier Patienten nach $3\frac{1}{2}$ bis 6 Jahren, in allen Fällen sind aber noch erhebliche Beschwerden, wie Harnverhaltungen und Pollakisurie vorhanden.

In sechs Fällen war die Besserung nur vorübergehend. Ein Patient wurde nach drei Vierteljahren prostatektomiert. In drei Fällen trat nach einiger Zeit wieder akute Harnverhaltung ein, zwei Fälle gingen in das dritte Stadium über. Ein Patient starb unter urämischen Erscheinungen, der andere kann spontan nicht mehr urinieren. Alle fünf Patienten müssen kathetrisiert werden.

Fünf Patienten sahen nach der Bestrahlung keinen Einfluß. Die Beschwerden bestehen unvermindert fort. Zwei Patienten müssen kathetrisiert werden, zwei andere wurden zweizeitig prostatektomiert.

Bei ausschließlicher Berücksichtigung der Angaben der Patienten über ihre Beschwerden ist in vier Fällen ein befriedigender Erfolg festzustellen. In ungefähr einem Viertel trat also eine ausreichende subjektive Besserung ein. Die Angaben Holfelders lauten etwas günstiger, er erreichte in 33% ausreichende subjektive Besserung.

Die Seltenheit objektiver Veränderungen hat ihren Grund in der beschränkten Strahlenempfindlichkeit des Prostatagewebes. Selbst im günstigsten Falle, wo ein ausgesprochenes Überwiegen der adenomatösen Gewebsteile vorliegt, ist ein Ansprechen im Ausmaße der bösartigen Geschwülste nicht zu erwarten, denn die gut differenzierten Geschwulstzellen reagieren auf die Strahlen nicht erheblich stärker, als das umliegende Gewebe. In Drüsen, in welchen

die Volumenvermehrung auf ein Wuchern der fibrösen Interzellularsubstanz zurückgeht, ist die Ansprechbarkeit noch geringer. Aus diesen Gründen ist eine Verkleinerung der Prostata in den seltensten Fällen zu erwarten. Der Weg einer Beeinflussung des Gewebes geht also über eine Schädigung der Bildungszellen, so daß im besten Falle ein Stillstand des Drüsenwachstums eintreten kann. Eine mechanische Veränderung der Harnabflußverhältnisse ist aber ganz besonders in Fällen von Mittellappenhypertrophie nicht zu erwarten, wo ein in die Blase gewucherter Lappen einen Ventilverschluß hervorruft. Die Häufigkeit eines so gearteten Verschlußes ist nicht genau geklärt. Im Beginn des Jahrhunderts wurde die Frage im Anschluß an die Operation nach *Bottini* erörtert. *Launois* fand auf Grund von 60 Sektionen, daß in zwei Drittel aller Prostatahypertrophien der Mittellappen der eigentliche Sitz der Hypertrophie war. *Dittel* dagegen behauptet, daß die Stenose der Harnröhre in den meisten Fällen durch vergrößerte Seitenlappen hervorgerufen wird. Bei den vor der Bestrahlung untersuchten 28 Patienten wurde achtmal eine Mittellappenhypertrophie gefunden.

In zahlreichen Fällen ist aber trotz gleichbleibender oder sogar vergrößerter Prostata ein günstiger Einfluß auf die Beschwerden der Patienten beobachtet worden. Es ist bekannt, daß den Röntgenstrahlen eine außerordentlich günstige Wirkung bei spastischen Zuständen aller Art zukommt. Bei Asthma bronchiale, spastischer Obstipation und Blasenkrämpfen wird diese spasmolytische Wirkung der Röntgenstrahlen, die nach *Holtusen* in einer Desensibilisierung besteht, therapeutisch angewendet. Spastische Zustände ähnlicher Art machen auch einen Teil der prostatistischen Beschwerden aus und finden Ausdruck in schmerzhaften Tenesmen und Pollakisurie.

Die Prostatahypertrophie ist fast immer mit entzündlichen und kongestiven Vorgängen im Drüsenbereich kombiniert. Durch die Untersuchungen *Heidenhains* und *Frieds* ist die entzündungshemmende Wirkung der Röntgenstrahlen, die bei chronischen Prozessen schon länger bekannt war, auch für akute Entzündungen festgestellt worden. Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese günstige

Wirkung auch für die entzündlichen Vorgänge bei der Prostatahypertrophie zutrifft und auf diesem Wege eine Besserung der subjektiven Beschwerden erreicht wird.

Die völlig verschiedene Beurteilung der Röntgenbestrahlung der Prostatahypertrophie hat ihren Grund in der Verschiedenheit des erwarteten Resultates, in dem verschiedenen Temperament der Kranken, in der unterschiedlichen ärztlichen Kritik und klinischen Befundung. Es ist nicht berechtigt, im Hinblick auf das hohe Alter der Patienten auf objektive Veränderungen insbesondere auf günstige Beeinflussung des Resturins und der Entleerungsverhältnisse zu verzichten, und nur eine Besserung der subjektiven Beschwerden anzustreben. Wenn auch die Forderung Schlagintweit's einer restitutio ad integrum mit normal großer Prostata und beschwerdefreier Miktion als zu weitgehend erscheint, so muß doch gefordert werden, daß neben der subjektiven Erleichterung ein Stillstand des krankhaften Organwachstums eintritt. Die Gefahr der Desensibilisation ist darin zu sehen, daß die Patienten unter dem Eindruck der subjektiven Erleichterung den Fortschritt ihres Leidens verkennen. Es empfiehlt sich aus diesem Grunde, daß jeder bestrahlte Prostataiker in regelmäßigen Abständen von etwa sechs Monaten sich der Untersuchung eines kritischen Urologen unterzieht.

Zusammenfassung.

Von 71 Bestrahlten scheiden wegen ungenügender Bestrahlung oder Beobachtung 37 aus.

Von den verbleibenden 34 wurden 15 urologisch beobachtet.

Objektiv trat

in 2 Fällen Verkleinerung der Prostata,

in 8 Fällen keine Änderung des Organbefundes,

in 5 Fällen weitere Volumenzunahme der Prostata ein.

Subjektiv wurden

3 Patienten innerhalb einer Beobachtungszeit von 2, 3, und 4 Jahren praktisch beschwerdefrei.

6 Patienten nur gering oder vorübergehend gebessert,

6 Patienten nicht beeinflusst.

3 Patienten mußten wegen heftiger Beschwerden prostatektomiert werden. Der histologische Befund einer entfernten Drüse zeigt keine Veränderungen, die auf Strahlenwirkung zurückzuführen sind.

1 Patient kam 3 Jahre nach der Bestrahlung ad exitum. Die Sektion ergab keine für Bestrahlung charakteristischen Veränderungen. Die Nierenbecken wiesen Zeichen der ascendierenden Infektion auf.

In 1 Falle wurden Blutungen günstig beeinflußt.

19 Patienten konnten urologisch nicht beobachtet werden.

Nach den Angaben der Patienten trat subjektiv in

in 2 Fällen 2 bzw. 4 Jahre anhaltende Beschwerdefreiheit ein,

in 2 Fällen 5 Jahre anhaltende erhebliche Besserung,

in 4 Fällen 3—6 Jahre dauernde, geringe Besserung,

in 6 Fällen vorübergehende Besserung,

in 5 Fällen keinerlei günstige Beeinflussung in;

in 2 Fällen mußte die Prostatektomie durchgeführt werden.

Die Röntgenbestrahlung bewirkt bei der Prostatahypertrophie nur selten eine Verkleinerung des Drüsenvolumens. In einem Drittel der Fälle kommt es zum Stillstand des Drüsenwachstums. Die Röntgentherapie vermag also nicht mit Sicherheit den Fortgang des Leidens aufzuhalten und eine Erleichterung der Harnentleerung herbeizuführen. In etwa einem Viertel der Fälle bringt sie dem Patienten Erleichterung ihrer subjektiven Beschwerden.

Auf Grund dieser Erfahrung läßt sich zusammenfassend sagen, daß die Röntgenbestrahlung der Prostatahypertrophie nur in manchen Fällen des Anfangsstadiums zur Linderung der subjektiven Beschwerden zu versuchen ist. Wegen der Gefahr des unbemerkten Fortschreitens der Erschwerung der Harnentleerung ist zu fordern, daß jeder bestrahlte Prostatiker in dauernder urologischer Beobachtung bleibt.

Zum Schluß fühle ich mich veranlaßt, Herrn Professor Dr. Freiherr von Redwitz für die Überlassung des Themas und Herrn Dr. von Scanzoni für die freundliche Unterstützung verbindlichst zu danken.

Literatur-Nachweis.

Eccard: Med. Welt 1934. Die Röntgenbehandlung der Prostatahypertrophie.

Garre-Borchard-Stich: Lehrbuch der Chirurgie.

Gotthard: Über die Behandlung der Prostatahypertrophie mit perinealer Prostataektomie und deren Erfolge in der Bonner Chirurgischen Klinik.

Haenisch-Holthufen: Einführung in die Röntgenologie.

Hintze: Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie.

Holfelder: Handbuch der Strahlentherapie.

Karo: Die Prostatahypertrophie, ihre Therapie und Pathologie.

Lazarus: Deutsche Zeitschrift für Strahlentherapie 1928. Erfahrungen über die Behandlung der Prostatahypertrophie.

Tiemann: Zeitschrift für Strahlentherapie 1928. Resultate der Röntgentherapie chirurgischer Erkrankungen.

Schlagintweit: Urologie des praktischen Arztes.

Markovits: Röntgentherapie in Tabellenform.

Voelcker-Wossidlo: Urologische Operationslehre.

Lebenslauf.

Ich, Ferdinand O r l a n d , wurde am 25. Februar 1912 als Sohn des praktischen Arztes Dr. med. Ferdinand Orland und seiner Ehefrau Maria geb. Schumacher in Wesseling geboren. Nachdem ich drei Jahre die Vorschule besucht hatte, kam ich Ostern 1921 auf die Sexta des Gymnasiums in Schleiden. Ostern 1931 bestand ich die Reifeprüfung am Aloisiuskolleg in Bad Godesberg. Nach Ablauf der ersten fünf Semester, die ich in Bonn studierte, bestand ich die ärztliche Vorprüfung. Auch meine klinischen Semester verbrachte ich alle in Bonn. Während der Semesterferien war ich insgesamt zehn Monate an Krankenanstalten als Famulus tätig. Am 1. 12 1936 bestand ich in Bonn das medizinische Staatsexamen.

